

Factorisation d'un trinôme du second degré

On appelle trinôme du second degré une expression littérale de la forme $ax^2 + bx + c$ avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Factoriser en une étape à l'aide des identités remarquables

On rappelle les trois identités remarquables :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad (1)$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad (2)$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \quad (3)$$

En utilisant dans chaque cas l'une de ces égalités, factoriser chacun des trinômes suivants :

$$\begin{array}{ccccc} x^2 - 4 & x^2 - 2x + 1 & x^2 + 4x + 4 & 4x^2 - 9 & x^2 + 10x + 25 \\ x^2 - 6x + 9 & x^2 - 5 & 4x^2 - 4x + 1 & 9x^2 + 12x + 4 & x^2 + 2\sqrt{5}x + 5 \end{array}$$

Factoriser en deux étapes à l'aide des identités remarquables

On considère le trinôme suivant : $x^2 + 6x + 8$.

- Écrire ce trinôme sous la forme $(x + \dots)^2 - (\dots)^2$.
- En déduire une factorisation du trinôme.

En utilisant cette technique, factoriser chacun des trinômes suivants :

$$\begin{array}{ccc} x^2 + 6x + 5 & x^2 + 4x - 5 & 4x^2 + 4x - 3 \\ x^2 + 4x + 1 & x^2 - 6x + 7 & 4x^2 - 4x - 4 \end{array}$$

Résolution des équations de degré 2

Pour chacune des équations suivantes, commencer par factoriser le membre de gauche puis résoudre l'équation :

$$\begin{array}{l} x^2 + 6x + 9 = 0 \\ x^2 - 16 = 0 \\ x^2 - 2x - 3 = 0 \\ x^2 - 3x - 4 = 0 \\ 2x^2 + 4x + 2 = 0 \\ -2x^2 - 4x + 7 = 0 \end{array}$$