

Correction du devoir de Mathématiques n°2

Exercice 1

- La fonction $f(x) = x^3 - 2x^2 + 7$ admet pour primitives sur \mathbb{R} , $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{2x^3}{3} + 7x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- La fonction $f(x) = \cos(3x + 5)$ admet pour primitives sur \mathbb{R} , $F(x) = \frac{1}{3} \sin(3x + 5) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- La fonction $f(x) = 3x(2x^2 + 1)^7$ admet pour primitives sur \mathbb{R} , $F(x) = \frac{3(2x^2 + 1)^8}{32} + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- La fonction $f(x) = \frac{\cos x}{(2 - \sin x)^2}$ admet pour primitives sur \mathbb{R} , $F(x) = \frac{1}{2 - \sin x} + k$, $k \in \mathbb{R}$.

Exercice 2

1. (a) La fonction g est une fonction polynôme donc elle est définie et dérivable sur \mathbb{R} et $g'(x) = 60x^2 + 6x = 6x(10x + 1)$, on en déduit les variations de la fonction g :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{10}$	0	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	+
$g(x)$	10, 01		10	
	↗	↘	↗	

- (b) Sur l'intervalle $[-\frac{1}{10}; +\infty[$, la fonction g est minorée par 10 donc l'équation $g(x) = 0$ n'admet pas de solution. Sur l'intervalle $] -\infty; -\frac{1}{10}]$, la fonction g est continue et strictement croissante avec $g(-\frac{1}{10}) > 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ donc d'après le *théorème des valeurs intermédiaires* l'équation $g(x) = 0$ admet une unique racine réelle α . On obtient à l'aide de la calculatrice l'encadrement : $-0,85 < \alpha < -0,84$.
- (c) On déduit des variations de g son tableau de signes :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

2. (a) La fonction f est définie pour $x^3 - 1 \neq 0$ soit $x^3 \neq 1$ soit $x \neq 1$ d'où $\mathcal{D}_f =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[$. On a :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x(10 + \frac{1}{x})}{x(x^2 - \frac{1}{x})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{10 + \frac{1}{x}}{x^2 - \frac{1}{x}} = 0$$

l'axe des abscisses est donc une asymptote horizontale à \mathcal{C}_f en $+\infty$ et $-\infty$. De plus :

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x < 1}} \frac{11}{x^3 - 1} = -\infty \quad \text{car } x < 1 \Rightarrow x^3 < 1 \Rightarrow x^3 - 1 < 0$$

et

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ x > 1}} \frac{11}{x^3 - 1} = +\infty \quad \text{car } x > 1 \Rightarrow x^3 > 1 \Rightarrow x^3 - 1 > 0$$

donc la droite d'équation $x = 1$ est une asymptote verticale à gauche et à droite à \mathcal{C}_f .


- (b) La fonction f est rationnelle donc dérivable sur ses intervalles de définition $] -\infty; 1[$ et $]1; +\infty[$, et :

$$f'(x) = \frac{(10) \times (x^3 - 1) - (10x + 1) \times (3x^2)}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-20x^3 - 3x^2 - 10}{(x^3 - 1)^2} = \frac{-g(x)}{(x^3 - 1)^2}$$

(c) On en déduit les variations de la fonction f :

x	$-\infty$	α	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$
$f(x)$	0	\nearrow $f(\alpha)$	\searrow $-\infty$	$+\infty$ \searrow 0

(d) la courbe représentative de la fonction f est la suivante :



(e) La tangente T à la courbe \mathcal{C}_f au point d'abscisse 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)(x - 0) = -1 - 10x$. On a :

$$\Delta(x) = f(x) - (-1 - 10x) = \frac{10x + 1}{x^3 - 1} + (10x + 1) = (10x + 1)\left(\frac{1}{x^3 - 1} + 1\right) = \frac{x^3(10x + 1)}{x^3 - 1}$$

x	$-\frac{1}{10}$	0	1	
x^3	$-$	$-$	0	$+$
$10x + 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x^3 - 1$	$-$	$-$	$-$	0
$\Delta(x)$	$-$	0	$+$	$+$

La tangente T est au dessus de \mathcal{C}_f sur les intervalles $[-\frac{1}{10}; 0]$ et $]1; +\infty[$.

Exercice 3

- On a $[\sin x]^2 + [\sin'(x)]^2 = [\sin x]^2 + [\cos x]^2 = 1$ et $[\cos x]^2 + [\cos'(x)]^2 = [\cos x]^2 + [-\sin x]^2 = [\cos x]^2 + [\sin x]^2 = 1$.
- (a) On considère une solution f de l'équation (E_1) , on a $[f(x)]^2 = 1 - [f'(x)]^2$ donc $0 \leq [f(x)]^2 \leq 1$ donc $-1 \leq f(x) \leq 1$.
- (b) On pose $f(x) = \cos[g(x)]$, la fonction f est solution de (E_1) si et seulement si la fonction g vérifie l'équation différentielle :

$$\begin{aligned} & (\cos[g(x)])^2 + (-g'(x) \sin[g(x)])^2 = 1 \\ \Leftrightarrow & (\cos[g(x)])^2 + [g'(x)]^2 (\sin[g(x)])^2 = 1 \\ \Leftrightarrow & 1 - (\sin[g(x)])^2 + [g'(x)]^2 (\sin[g(x)])^2 = 1 \\ \Leftrightarrow & ([g'(x)]^2 - 1) (\sin[g(x)])^2 = 0 \end{aligned}$$

- On constate que les fonctions g vérifiant $g(x) = \pm x + k$ et $g(x) = 0[\pi]$ sont solutions de l'équation différentielle (E_2) .
- On en déduit que les fonction $f(x) = \cos(\pm x + k)$ et $f(x) = \pm 1$ sont solutions de l'équation (E_1) .
- Les fonctions *sinus* et *cosinus* appartiennent à la première famille de de solutions car $\sin x = \cos(x - \frac{\pi}{2}) = \cos(-x + \frac{\pi}{2})$ et $\cos x = \cos(x + 0) = \cos(-x + 0)$.