

Fonctions exponentielles - Fonctions logarithmes

1 Fonctions exponentielles

Définition 1. Soit a un réel strictement positif, on appelle fonction exponentielle de base a , la fonction \exp_a définie par $\exp_a(x) = e^{x \ln a}$.

- (a) Montrer que $\exp_e = \exp$ et que $\exp_a(x + y) = \exp_a(x) \exp_a(y)$ pour x et y réels.
(b) Montrer que $\exp_a(n) = a^n$ pour $n \in \mathbb{N}$, en déduire une autre notation possible pour $\exp_a(x)$.
(c) Montrer que la fonction \exp_a est définie et dérivable sur \mathbb{R} et calculer \exp'_a .
(d) En déduire les variations de la fonction \exp_a suivant les valeurs de a .
- (a) Montrer que l'équation $x^n = y_0$ admet une unique solution positive x_0 pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $y_0 \geq 0$.
(b) Montrer que si $y_0 > 0$ alors $x_0 = y_0^{\frac{1}{n}}$.

2 Fonctions logarithmes

Définition 2. Soit a un réel strictement positif différent de 1, on appelle fonction logarithme de base a , la fonction \log_a définie par $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$.

- Montrer que $\log_e = \ln$ et que $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$ pour x et y réels et strictement positifs.
- (a) Montrer que l'équation $a^x = y_0$ admet une unique solution x_0 pour y_0 strictement positif et a strictement positif différent de 1.
(b) Montrer que $x_0 = \log_a(y_0)$.