

Variables aléatoires

1 Notion de Variable Aléatoire

Définition 1. *Étant donné un univers fini Ω , on appelle variable aléatoire X sur Ω toute fonction de Ω dans \mathbb{R} .*

Exemple 1. *Somme des numéros lors d'un lancer de deux dés cubiques.*

Définition 2. *Soit X une variable aléatoire sur un univers fini $\Omega = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ muni d'une loi de probabilité P . On note $\Omega' = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$ l'ensemble des valeurs prise par la variable aléatoire X et $(X = y_k)$ l'événement de Ω constitué des éventualités ayant y_k pour image par la variable aléatoire X .*

La loi de probabilité sur Ω' définie en associant aux y_k les probabilités $P(X = y_k)$ est appelée loi de probabilité de la variable aléatoire X .

Remarque 1. *On a $m \leq n$.*

Exemple 2. *Loi de probabilité de la somme des numéros lors d'un lancer de deux dés cubiques équilibrés.*

Définition 3. *Soit X une variable aléatoire sur un univers fini Ω muni d'une loi de probabilité P et prenant les valeurs $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$.*

On appelle espérance de la variable aléatoire X le réel :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{k=m} y_k P(X = y_k) = y_1 P(X = y_1) + \dots + y_m P(X = y_m)$$

On appelle variance de la variable aléatoire X le réel :

$$V(X) = \sum_{k=1}^{k=m} (y_k - E(X))^2 P(X = y_k) = (y_1 - E(X))^2 P(X = y_1) + \dots + (y_m - E(X))^2 P(X = y_m)$$

On appelle écart-type de la variable aléatoire X le réel $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Remarque 2. *Ces définitions sont cohérentes avec les Statistiques car $\sum_{k=1}^{k=m} P(X = y_k) = 1$.*

Exemple 3. *Calcul de l'espérance de la variance et de l'écart-type de la somme des numéros lors d'un lancer de deux dés cubiques équilibrés.*

2 Loi de Bernoulli - Loi Binomiale

2.1 Loi de Bernoulli

Définition 4. *On appelle épreuve de Bernoulli de paramètre p une expérience aléatoire possédant deux issues appelées "succès" et "échec" de probabilités p et $q = 1 - p$.*

Exemple 4. *Lancer d'une pièce truquée : $\Omega = \{Pile, Face\}$ et $P(Pile) = p = \frac{2}{3}$.*

Définition 5. *On appelle loi de Bernoulli de paramètre p la loi de probabilité de la variable aléatoire associée à une épreuve de Bernoulli de paramètre p dont la valeur est 1 si l'issue est "succès" et 0 si l'issue est "échec".*

Propriété 1. *Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernoulli de paramètre p , alors :*

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = pq = p(1 - p)$$

Démonstration. au programme. □

2.2 Loi Binomiale

Définition 6. On appelle factorielle d'un entier naturel n le produit des nombres naturels de 1 jusqu'à n , on pose $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-1) \times n$ et par convention $0! = 1$.

Exemple 5. Calcul du nombre de "mots" formés un utilisant une fois et une seule chacune des lettres a , b , c et d .

Définition 7. Étant donné un ensemble E contenant n éléments, on note $\binom{n}{k}$ et on lit "k parmi n" le nombre de sous-ensembles de E contenant k éléments. On convient de plus que $\binom{n}{0} = 1$.

Exemple 6. Calcul du nombre de mains de trois cartes dans un jeu de 32 cartes.

Propriété 2. Soient n et k deux entiers avec $0 \leq k \leq n$, alors :

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Démonstration. au programme. □

Propriété 3. Soient n et k deux entiers avec $0 \leq k \leq n$, alors :

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} \quad \text{et} \quad \binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Démonstration. au programme. □

Théorème 1. Formule du binôme

Pour tous nombres réels a et b et tout nombre entier naturel n non nul, on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{k=n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-2} a^2 b^{n-2} + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + b^n$$

Démonstration. au programme. □

Corollaire 1. Pour tout nombre entier naturel n non nul, on a :

$$\sum_{k=0}^{k=n} \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \dots + \binom{n}{k} + \dots + \binom{n}{n-1} + \binom{n}{n} = 2^n$$

Démonstration. au programme. □

Définition 8. On appelle schéma de Bernoulli de paramètres n et p l'expérience aléatoire consistant à répéter n fois une épreuve de Bernoulli de paramètre p .

Définition 9. On appelle loi binomiale de paramètres n et p la loi de probabilité de la variable aléatoire associée à un schéma de de Bernoulli de paramètres n et p dont la valeur est le nombre de succès obtenus.

Exemple 7. Calcul de l'espérance du nombre total de Pile obtenus lors de trois lancers successifs d'une pièce truquée : $\Omega = \{Pile, Face\}$ et $P(Pile) = p = \frac{2}{3}$.

Propriété 4. Soit X une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n et p , alors :

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad ; \quad E(X) = np \quad \text{et} \quad V(X) = npq = np(1-p)$$

Démonstration. admis. □

Exemple 8. Calcul de la probabilité d'obtenir 45 fois Pile lors de 100 lancers successifs d'une pièce truquée : $\Omega = \{Pile, Face\}$ et $P(Pile) = p = \frac{2}{3}$.

3 Lois continues

On considère dans cette partie des variables aléatoires prenant une infinité de valeurs, l'univers Ω considéré étant lui aussi infini.

3.1 Notion de densité de probabilité

Définition 10. Soit f une fonction continue sur \mathbb{R} et a un réel, on appelle :

$\int_a^{+\infty} f(x)dx$ la limite lorsqu'elle existe de $\int_a^M f(x)dx$ pour $M \rightarrow +\infty$,

$\int_{-\infty}^a f(x)dx$ la limite lorsqu'elle existe de $\int_M^a f(x)dx$ pour $M \rightarrow -\infty$,

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ la somme lorsqu'elles existent des intégrales $\int_{-\infty}^a f(x)dx$ et $\int_a^{+\infty} f(x)dx$.

Exemple 9. Calcul de $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ et $\int_0^{+\infty} e^{-\lambda x} dx$ ($\lambda > 0$).

On admet pour la définition suivante que la notion d'intégrale se généralise au cas des fonctions continues sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs.

Définition 11. On appelle densité de probabilité une fonction définie sur \mathbb{R} qui est positive, continue sauf éventuellement en un nombre fini de valeurs et telle que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Exemple 10. $f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ ($\lambda > 0$)

Définition 12. Soit f une densité de probabilité, on appelle fonction de répartition associée à la densité de probabilité f la fonction $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$.

Exemple 11. Calcul de la fonction de répartition associée aux densités de probabilité de l'exemple précédent.

3.2 Loi uniforme sur $[0; 1]$

Définition 13. On dit que la variable aléatoire X suit la loi uniforme sur l'intervalle $[0; 1]$ si pour tous réels a et b on a :

$$P(X \text{ à valeurs dans } [a; b]) = \int_a^b f(x)dx \text{ avec } f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple 12. Probabilité de tirer un réel au hasard dans l'intervalle $[0; 1]$, probabilité de tirer un réel au hasard dans l'intervalle $[a; b]$.

3.3 Loi exponentielle

Définition 14. On dit que la variable aléatoire X suit la loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$ si pour tous réels a et b on a :

$$P(X \text{ à valeurs dans } [a; b]) = \int_a^b f(x)dx \text{ avec } f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Exemple 13. Probabilité de durée de vie sans vieillissement.