

Devoir de Mathématiques n°3

Restitution organisée de connaissances

Cet exercice permet de mobiliser quelques connaissances de base afin de démontrer que la fonction $\begin{cases} f(x) = \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$ est continue en 0.

On rappelle le « Théorème des Gendarmes » :

Théorème. Soient u, v et w trois fonctions définies sur un intervalle I de \mathbb{R} avec $\alpha \in I$ telles que $u(x) \leq v(x) \leq w(x)$ pour tout $x \in I$. Si $\lim_{x \rightarrow \alpha} u(x) = l$ et $\lim_{x \rightarrow \alpha} w(x) = l$ alors $\lim_{x \rightarrow \alpha} v(x) = l$.

1. (a) Étudier les variations de la fonction $g(x) = x - \sin x$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.
(b) En déduire que $f(x) \leq 1$ pour $x \in [-\pi; \pi]$.
2. (a) Étudier les variations de la fonction $h(x) = \sin x - x \cos x$ sur l'intervalle $[-\pi; \pi]$.
(b) En déduire que $f(x) \geq \cos x$ pour $x \in [-\pi; \pi]$.
3. Démontrer que la fonction f est continue en 0.

Exercice 1

On considère la fonction $f(x) = \frac{4}{x+1}$ pour $x \in [0; 1]$.

1. Soit le polynôme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, déterminer a, b, c et d pour que P possède les mêmes valeurs et les mêmes nombres dérivés que f en 0 et 1.
2. Démontrer que $f(x) - P(x) = \frac{x^2(x-1)^2}{x+1}$.
3. Étudier les variations de la fonction $\delta(x) = f(x) - P(x)$ sur l'intervalle $[0; 1]$.

Exercice 2

Le but de l'exercice est de résoudre l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} f'(x) + 2x(1 + [f(x)]^2) = 0 \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

1. On pose $f(x) = \tan[g(x)]$ avec g définie et dérivable telle que $-\frac{\pi}{2} < g(x) < \frac{\pi}{2}$. Montrer que la fonction g est solution de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} g'(x) + 2x = 0 \\ g(0) = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

2. Déterminer la fonction g et en déduire l'expression de la fonction f .

Exercice 3

- On considère l'équation $(E) : z^3 + 8 = 0$, $z \in \mathbb{C}$.
 - Déterminer les réels a , b et c tels que $z^3 + 8 = (z + 2)(az^2 + bz + c)$.
 - Résoudre l'équation (E) .
- Le plan est muni d'un repère orthonormé, on considère les points A , B et C d'affixes respectives $z_A = 2$, $z_B = -1 + i\sqrt{3}$ et $z_C = -1 - i\sqrt{3}$.
 - Faire une figure.
 - Prouver que le triangle ABC est équilatéral.

Exercice 4

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

- On rappelle que deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ sont orthogonaux si et seulement si $xx' + yy' = 0$ et colinéaires si et seulement si $xy' = x'y$. On note respectivement les affixes des vecteurs \vec{u} et \vec{v} : $z_{\vec{u}} = x + iy$ et $z_{\vec{v}} = x' + iy'$.
 - Montrer que les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont orthogonaux si et seulement si $\operatorname{Re}(z_{\vec{u}}\overline{z_{\vec{v}}}) = 0$.
 - Montrer que les vecteurs \vec{u} et \vec{v} sont colinéaires si et seulement si $\operatorname{Im}(z_{\vec{u}}\overline{z_{\vec{v}}}) = 0$.
- Étant donné un point $M(x; y)$ du plan d'affixe $z = x + iy$ on définit le point M' d'affixe $z' = z^2$.
 - Calculer les coordonnées du point M' en fonction de x et de y .
 - Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que les vecteurs \overrightarrow{OM} et $\overrightarrow{OM'}$ soient orthogonaux.
 - Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que les vecteurs \overrightarrow{OM} et $\overrightarrow{OM'}$ soient colinéaires.