

Devoir maison de Mathématiques n°4

Exercice 1

On considère l'équation $(E) : z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + i)z - 4 = 0$ où z désigne un nombre complexe.

Partie A

- (a) Montrer que (E) admet une solution réelle notée z_1 .
(b) Déterminer les deux nombres complexes a et b tels que, pour tout nombre complexe z , on ait :

$$z^3 - (4 + i)z^2 + (7 + i)z - 4 = (z - z_1)(z - 2 - 2i)(az + b)$$

- Résoudre (E) .

Partie B

Dans le plan muni d'un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) , on considère les trois points A , B et C d'affixes respectives 1 , $2 + 2i$ et $1 - i$.

- Représenter A , B et C .
- Déterminer le module et un argument de $\frac{2 + 2i}{1 - i}$. En déduire la nature du triangle OBC .
- Que représente la droite (OA) pour le triangle OBC ? Justifier votre réponse.
- Soit D l'image de O par la rotation d'angle $-\frac{\pi}{2}$ et de centre C . Calculer l'affixe de D .
- Quelle est la nature du quadrilatère $OCDB$?

Exercice 2

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct (O, \vec{u}, \vec{v}) (unité graphique 4cm). Soit A le point d'affixe $z_A = i$ et B le point d'affixe $z_B = e^{-i\frac{5\pi}{6}}$.

- Soit r la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$. On appelle C l'image de B par r .
 - Déterminer une écriture complexe de r .
 - Montrer que l'affixe de C est $z_C = e^{-i\frac{\pi}{6}}$.
 - Écrire z_B et z_C sous forme algébrique.
 - Placer les points A , B et C .
- Soit D le barycentre des points A , B et C affectés respectivement des coefficients 2, -1 et 2.
 - Montrer que l'affixe de D est $z_D = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$. Placer le point D .
 - Montrer que A , B , C et D sont sur un même cercle.
- Soit h l'homothétie de centre A et de rapport 2. On appelle E l'image de D par h .
 - Déterminer une écriture complexe de h .
 - Montrer que l'affixe de E est $z_E = \sqrt{3}$. Placer le point E .
- Calculer le rapport $\frac{z_D - z_C}{z_E - z_C}$. On écrira le résultat sous forme exponentielle.
 - En déduire la nature du triangle CDE .

Exercice 3

On se propose de démontrer qu'il existe une seule fonction f dérivable sur \mathbb{R} vérifiant la condition :

$$(C) \begin{cases} f(-x)f'(x) = 1 & \text{pour tout nombre réel } x \\ f(0) = -4 \end{cases}$$

(où f' désigne la fonction dérivée de la fonction f) et de trouver cette fonction.

1. On suppose qu'il existe une fonction f vérifiant la condition (C) et on considère alors la fonction g définie sur \mathbb{R} par :

$$g(x) = f(-x)f(x)$$

- (a) Démontrer que la fonction f ne s'annule pas sur \mathbb{R} .
- (b) Calculer la fonction dérivée de la fonction g .
- (c) En déduire que la fonction g est constante et déterminer sa valeur.
- (d) On considère l'équation différentielle :

$$(E) \quad y' = \frac{1}{16}y$$

Montrer que la fonction f est solution de cette équation et qu'elle vérifie $f(0) = -4$.

2. Question de cours

- (a) On sait que la fonction $x \mapsto e^{\frac{x}{16}}$ est solution de l'équation différentielle (E). Démontrer alors que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E) est l'ensemble des fonctions, définies sur \mathbb{R} , de la forme $x \mapsto Ke^{\frac{x}{16}}$ où K est un nombre réel quelconque.

- (b) Démontrer qu'il existe une unique solution de l'équation différentielle (E) prenant la valeur -4 en 0.

3. Déduire des questions précédentes qu'il existe une seule fonction dérivable sur \mathbb{R} satisfaisant la condition (C) et préciser quelle est cette fonction.